

	Возраст/Инфекция	ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В	ТУБЕРКУЛЕЗ	ПНЕВМО- КОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ	ДИФТЕРИЯ КОКЛЮШ СТОЛБНЯК	ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ	ПОЛИО- МИЕЛИТ	КОРЬ КРАСНУХА ЭП. ПАРОТИТ	ГРИПП
В роддоме	НОВОРОЖДЕННЫЕ первые 24 часа	1							
	НОВОРОЖДЕННЫЕ первые 3-7 дней		1						
В прививочном кабинете	1 МЕСЯЦ	2							
	2 МЕСЯЦА	3*		1					
	3 МЕСЯЦА				1	1*	1		
	4,5 МЕСЯЦА			2	2	2*	2		
	6 МЕСЯЦЕВ	3			3	3*	3		1
	7 МЕСЯЦЕВ								
	8 МЕСЯЦЕВ								
	12 МЕСЯЦЕВ	4*						1	
	15 МЕСЯЦЕВ			3					
	18 МЕСЯЦЕВ				4	4*	4		
	20 МЕСЯЦЕВ						5		
	26 МЕСЯЦЕВ								Ежегодно
	6 ЛЕТ		2**					2	
	6 - 7 ЛЕТ					5 без коклюша			
14 ЛЕТ					6 без коклюша		6		
от 18 ЛЕТ					КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ без коклюша			КРАСНУХА для недостаточно привитых женщин	

* для детей группы риска

** делается при отрицательной реакции манту

Помните, что только вакцинация, проведенная по полной схеме, может обеспечить качественную защиту от инфекции.

На основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок"

Подробную информацию о принципах и правилах проведения прививок, а также ответы на вопросы ведущих экспертов вакцинопрофилактики вы найдете на сайте ЯПривит.рф/YaPrivit.ru